

了解造影剂： 放射检查指南

25 Years
REVOLUTIONISING
HEALTHCARE

SUNWAY
MEDICAL CENTRE
Sunway City Kuala Lumpur

了解 X 光造影剂：您需要了解的事项

造影剂，一般被称为“染料”，是一种特殊的液体。在进行计算机断层（CT）扫描、磁共振成像（MRI）或透视筛查时，造影剂会通过插入您前臂静脉中的小管注入体内。这种液体在 X 光成像中起着至关重要的作用，它能够将在体内的血管及器官的细节更加详细地显现出来。大多数的计算机断层（CT）扫描、磁共振成像（MRI）和透视筛查都会使用造影剂来提高影像的清晰度。

注射造影剂前：您的安全首要

在注射造影剂之前，医护人员会对您进行简单的筛查，以识别任何可能导致您出现不良反应的因素，从而避免潜在风险。造影剂的潜在不良反应包括：

轻度：

- 恶心及呕吐
- 皮肤瘙痒
- 头痛
- 面部潮红
- 荨麻疹
- 皮疹

中度：

- 心律异常
- 血压高/低
- 喘息
- 严重荨麻疹
- 呼吸急促
- 严重皮疹

重度：

- 严重性低血压
- 心脏骤停
- 抽搐
- 肾脏损伤
- 过敏性休克

注射部位反应：

- 外渗（肿胀，造影剂渗入周围组织）
- 炎症（瘙痒）
- 疼痛及灼烧感

这些反应都很罕见，而且大多数是暂时性的，通常不需要治疗或只需简单的急救措施。



在某些特定情况下，特别是当已知或怀疑胃部或肠道有疾病时，您可能需要在进行计算机断层（CT）扫描、磁共振成像（MRI）或透视筛查前饮用造影剂混合物或水。此外，对于涉及胃部或肠道的特殊检查，造影剂可能会通过直肠注射。然而，这种方法仅在诊断过程绝对必要时才会使用。

造影检查后的护理：确保您的健康

在完成造影检查后，保持充足的水分摄入非常重要。饮用大约五杯水可以帮助排出检查过程中注入的造影剂。医院工作人员会在检查后对您进行监测，以便及时发现并处理任何潜在的并发症，确保您的安全和舒适。

重要注意事项：您的健康是首要的

然而，了解以下特殊注意事项非常重要：

肾脏负担：

在极少数情况下，造影剂可能会对肾脏造成负担，尤其是本身患有肾脏疾病的糖尿病患者。如果您是属于这类型患者，可能需要在检查后咨询肾脏专科医生进行随访。尽管这种情况罕见，但在严重情况下，可能会对肾脏造成不可逆转的损伤。

外渗问题：

严重的造影剂外渗，即造影剂渗入周围组织，是一种罕见情况。如果发生这种情况，可能需要进行手术或通过外科会诊以有效处理问题。

过敏反应：

虽然因造影剂造成的过敏反应并不常见，但仍有可能发生。尽管这些过敏反应通常不会危及生命，但为了预防任何并发症，您必须告知医护人员您可能存在的任何过敏史。



如果您在检查过程中出现任何不适症状，请立即告知医护人员。



您的安全是我们的首要任务：
坦诚沟通至关重要

您的安全与健康是我们的首要任务。如果您对治疗过程及其潜在风险有任何疑问，或在扫描或治疗后出现任何异常症状，请务必与您的医护人员坦诚沟通。我们随时为您解答疑问并解决问题，以确保您拥有安全、舒适的检查体验。



扫描二维码
下载副本

